

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**02.08.2013 № 684**

**Реєстраційне посвідчення**  
**№ UA/8655/01/01**

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**СТОМАТОФІТ**

**Склад лікарського засобу:**

**діючі речовини:** 100 г розчину містять екстракту рідкого (0,65:1) із суміші сировини: квіток ромашки (*Matricaria chamomilla L.*) - 13 г, кори дуба (*Quercus robur L.*) – 13 г, листя шавлії (*Salvia officinalis L.*) - 13 г, трави арніки (*Arnica montana L.*) - 6,5 г, кореневища аїру (*Acorus calamus L.*) - 6,5 г, трави м'яти перцевої (*Mentha piperita L.*) - 6,5 г, трави чебрецю звичайного (*Thymus vulgaris L.*) - 6,5 г; екстрагент: етанол 70% (м/м);  
**допоміжні речовини:** етанол 96 %, вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для ротової порожнини.

Непрозора рідина темно-коричневого кольору зі специфічним запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Фітофарм Кленка С.А.,  
Кленка 1, 63-040, Нове М'ясто над Вартою, Польща.

**Фармакотерапевтична група.**

Інші препарати для місцевого застосування в стоматології. Код АТС A01A D11.

Препарат чинить в'яжучу, пом'якшувальну, протизапальну дію на слизову оболонку порожнини рота завдяки екстрактам кори дуба, квіткам ромашки і листям шавлії. Крім того, дубильні речовини та ефірні олії, які містяться в препараті, чинять антисептичну, антибактеріальну та протигрибкову дію на слизову оболонку порожнини рота та ясен. Тести *in vitro* показали, що ефірні олії шавлії та ромашки чинять бактерицидну дію щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій, а також фунгіцидну дію щодо *Candida albicans*.

**Показання для застосування.**

Комплексне місцеве лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота – гінгівіту, пародонтиту, стоматиту, глоситу (в тому числі спричинених дріжджовими грибами).

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до арніки, ромашки або інших рослин родини *Asteraceae (Compositae)*, бронхіальна астма.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Безпека щодо застосування препарату в період вагітності і годування груддю не встановлена. Перед застосуванням препарату слід порадитися з лікарем.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не впливає.

**Діти.**

До складу препарату входить спирт етиловий, тому не слід застосовувати препарат дітям віком до 6 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовують у вигляді полоскань дорослим і дітям віком від 6 років. Полоскати порожнину рота 3-4 рази на добу 15 % водним розчином препарату (блізько 10 мл препарату розчинити у  $\frac{1}{4}$  склянки води). Тривалість застосування визначає лікар залежно від клінічного ефекту та характеру комплексної терапії.

**Передозування.**

Про випадки передозування не повідомлялося.

При передозуванні можливе посилення побічних ефектів.

**Побічні ефекти.**

Можливі алергічні реакції, включаючи, гіперемію, свербіж.

Місцево – коротковажне відчуття печіння слизової оболонки порожнини рота одразу після полоскання, а також оборотна зміна кольору зубів, яка зникає при регулярному їх чищенні.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідомі.

**Термін придатності.**

3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в сухому, темному місці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 45 мл, 50 мл, 100 мл або 120 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**

02.08.2013